

JASOL SOLID - TABLETKA SAMOROZPUSZCZALNA

Produkt do dezynfekcji powierzchni w służbie zdrowia, powierzchni mających kontakt z żywnością, w higienie weterynaryjnej oraz do dezynfekcji wody do picia i w basenach kąpielowych.

Biuro Handlowe Maciej Bednarski



UWAGA

Zawiera: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (CAS 51580-86-0).

Nr serii, data ważności:.....

Pozwolenie MZ nr 0611/04 na obrót produktem biobójczym

Opis działania na organizm człowieka, środowisko i organizmy wodne:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu, H319 – Działa drażniąco na oczy, H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, EUH031 - „W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy”, EUH206 - „Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).”

Środki ostrożności:

P102 – Chronić przed dziećmi, P273 – Unikać uwolnienia do środowiska., P280 – Stosować odzież ochronną/ochronę twarzy, Odpowiednie rękawice ochronne, np. z neoprenu, P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Pierwsza pomoc:

Wdychanie: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zasięgnąć porady lekarza., **Kontakt ze skórą:** Odzież i buty zanieczyszczone produktem niezwłocznie zdjąć. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć wodą oraz dobrze spłukać. Zasięgnąć porady lekarza. **Kontakt z oczami:** Usunąć soczewki kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach przemyć niezwłocznie oczy dużą ilością czystej bieżącej wody (przemywać przez co najmniej 15 minut). Zasięgnąć porady lekarza. **Połknięcie:** Po połknięciu niewielkiej ilości (nie więcej niż łyk) wypłukać jamę ustną wodą, podać aktywowany węgiel leczniczy i zasięgnąć porady lekarza.

Instrukcja użycia tabletek samorozpuszczalnych JASOL SOLID

Po stwierdzonym zanieczyszczeniu studni, zbiornika, instalacji, sieci wodociągowej

1. Do skażonej studni (zbiornika, instalacji, sieci itp.) wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na 1 m³ wody (np. przy studni 3 m³ – 60 tabletek).
2. Po upływie minimum 2 godzin skażoną wodę ze studni (instalacji) wypompować.
3. Napełnić ponownie studnię (instalację) wodą i przepłukać dużą ilością wody.
4. Po wykonaniu odkażania woda powinna zostać przebadana przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub inną jednostkę badającą wodę.

Do dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością, blaty kuchenne, podłogi, kafelki, zlewy, sanitariaty itp.

1. Przed dezynfekcją sprzęty oczyścić, stosować na powierzchnie czyste.
2. Użyć 2 tabletki na 10 litrów wody czystej (nieskażonej), natomiast w przypadku mycia powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością 2 tabletki na 10 litrów wody zdatnej do picia.
3. Myta powierzchnia jest zdezynfekowana po 15 minutach od kontaktu z roztworem.
4. Dezynfekowane powierzchnie i przedmioty mające kontakt z żywnością koniecznie spłukać wodą zdatną do picia.

Zasady bezpieczeństwa osobistego w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych.

Ponieważ chlor jest środkiem niebezpiecznym (Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy – chlor.), **przy dezynfekcji należy zachować szczególne środki ostrożności:**

Chronić przed dziećmi, Unikać uwolnienia do środowiska, Stosować odzież ochronną/ochronę twarzy, Odpowiednie rękawice ochronne, np. z neoprenu, Przechowywać w zamkniętym pojemniku, W razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu niewielkiej ilości (nie więcej niż łyk) wypłukać jamę ustną wodą, podać aktywowany węgiel leczniczy i zasięgnąć porady lekarza.

Informacja o produkcji

- pozwolenie nr 0611/04 na obrót produktem biobójczym,
- 1 tabletką o masie 3,2 g zawiera 1,5 g chloru aktywnego, 100 g zawiera 86,60 % dichloroizocyjanuranu sodu,
- karta charakterystyki preparatu na stronie internetowej www.jasol.pl